

РОНІДАЗОЛ
(таблетки для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки округлої форми від білого до жовтого кольору, в оболонці, зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 грам препарату містить діючу речовину:

ронідазол – 250 мг.

Препарат випускається у наступних формах:

Таблетка масою 480 мг, що містить діючу речовину ронідазол – 120 мг.

Таблетка масою 120 мг, що містить діючу речовину ронідазол – 30 мг.

Допоміжні речовини: цукор, полівінілпіролідон, крохмаль картопляний, стеарат кальцію, тальк, альбумін, сухе молоко, ароматизатор, лактоза.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати.

Ронідазол (група нітроїмідазольних сполук) діє на найпростіші, трихомонади та анаеробні бактерії. З'єднання продуктів реакції ронідазолу з ДНК найпростіших клітин або бактерій призводить до її загибелі. Створення міцних сполук значно посилює кислий внутрішньоклітинний рівень рН, що, крім іншого, підтверджує вибірккову дію похідних 5-нітроїмідазолу щодо анаеробних бактерій та деяких найпростіших. Крім того, в результаті реакції ронідазолу створюються продукти, що являють собою внутрішньоклітинні донори вільних аеробних радикалів, які додатково ушкоджують інші, ніж ДНК, молекули внутрішньоклітинних. Це посилює клітинне руйнування і призводить до найшвидшої загибелі найпростіших або бактерій.

Після перорального застосування ронідазол майже повністю швидко абсорбується з травного каналу та досягає максимальної концентрації в плазмі крові через 12-14 годин. Його біодоступність становить понад 90%. Термін дії ронідазолу у плазмі після перорального застосування для більшості тварин становить приблизно 11 годин, блокуючи його репродукцію шляхом інгібування синтезу ДНК.

Препарат у рекомендованих дозах не має сенсibilізуючої, ембріотоксичної і тератогенної дії.

Застосування

Профілактика та лікування собак та котів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту та інших органів і тканин, які спричинені найпростішими *Trichomonas spp.* та *Giardia spp.*

Дозування

Собаки: при лікуванні тварин, уражених лямбліозом (гіардіозом) *Giardia spp.* таблетки застосовують перорально, 1 раз на добу у наступних дозах: 30-50 мг ронідазолу на 1 кг маси тіла тварини, або:

- 1 таблетка (масою 480мг) на 2,4 -4 кг маси тіла тварини;

- 1 таблетка (масою 120мг) на 0,6-1 кг маси тіла тварини.

Курс лікування - 7 діб.

Коти: при лікуванні тварин, уражених лямбліозом (гіардіозом) таблетки застосовують перорально, 1 раз на добу, у наступних дозах: 30 мг ронідазолу на 1 кг маси тіла, або:

- 1 таблетка (масою 480мг) на 4 кг маси тіла тварини

- 1 таблетка (масою 120мг) на 1 кг маси тіла тварини

Курс застосування- протягом 7 діб.

При лікуванні інфекцій, викликаних *Trichomonas foetus* препарат застосовують перорально 1 раз на добу, у наступних дозах: 30 мг ронідазолу на 1 кг маси тіла, або:

- 1 таблетка (масою 480мг) на 4 кг маси тіла тварини;

- 1 таблетка (масою 120мг) на 1 кг маси тіла тварини.

Курс застосування- протягом 14 діб.

Зміни у тривалості курсу застосування препарату визначає лікар ветеринарної медицини в залежності від стану тварини, важкості та перебігу захворювання та результатів лабораторних досліджень.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати вагітним та лактуючим тваринам.

Не застосовувати виснаженим тваринам, тваринам з ознаками вірусної інфекції, порушеннями функцій нервової системи, нирок і печінки.

Застереження

При застосуванні препарату відповідно до листівки-вкладки побічних явищ і ускладнень, як правило, не відзначається.

Лікування тварин поєднуватися з дезінфекцією приміщень, вольєрів, кліток, де утримуються хворі тварини, щоб уникнути можливості перезараження.

Домашніх тварин бажано викупати з шампунем, щоб змити спори паразитів, що потрапляють на шерсть.

Форма випуску

Полімерні контейнери по 15, 20, 50 таблеток. Вторинна упаковка – картонна коробка разом із листівкою-вкладкою.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей та тварин місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна